

El coccidiostato  
de elección para el  
control de diarreas.

# Coccigan® D

## Diclazuril 2%

Coccigan® D es diclazuril al 2%, (20 mg/mL), de administración oral en lechones y porcinos adultos para el control, prevención y tratamiento de la coccidiosis.

### VENTAJAS COMPETITIVAS

- 🐷 Coccigan® D, molécula más eficaz que requiere menor volumen para un dosis efectiva.
- 🐷 Coccigan® D, seguro en hembras gestantes; no ebriotóxico, no mutagénico, no teratogénico.
- 🐷 Coccigan® D, es altamente seguro hasta 40 veces la dosis.
- 🐷 Coccigan® D, mejora la conversión alimenticia.
- 🐷 Coccigan® D, por ser coccidiostato, genera memoria inmunológica.
- 🐷 Coccigan® D, en lechones indicado como protocolo profiláctico entre los 3 a 5 días de nacidos.
- 🐷 Coccigan® D, sin tiempo de retiro en carne; se puede administrar en cualquier etapa de la producción.

### BENEFICIOS PRODUCTIVOS

- 🐷 Camadas homogéneas al destete
- 🐷 Reducción de diarrea en lechones
- 🐷 Reducción de tasa de morbi-mortalidad
- 🐷 Mayor ganancia de peso al destete

### Dosis / Administrar via oral

- Lechones.....0,5 ml / lechon
- Cerdos adultos.....3 ml / 20 kg

### Presentaciones

- \*Jeringa dosificadora por 20 mL
- \*Frasco de 100 mL.
- \*Frasco por 500 mL.



COMPOSICIÓN:	
Cada 1 mL de Coccigan® D contiene:	
Diclazuril.....	20 mg.